



ЛЕВАМИЗОЛ-7,5%
(раствор для инъекций)
листок-вкладыш

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим запахом.

Состав

1 мл препарата содержит действующее вещество:

левамизола гидрохлорид - 0,075 г (в пересчете на действующее вещество).

Вспомогательные вещества: натрия цитрат, лидокаин, трилон Б, пропиленгликоль, натрия метабисульфит, метилпарабен, пропилпарабен, вода апирогенная.

Фармакологические свойства

ATCvet QP52, антигельминтные ветеринарные препараты, (ATCvet QP52AE01, левамизол).

Левамизол - синтетическое соединение из группы тетраамидаолов, антигельминтик широкого спектра нематоцидного действия, активен в отношении личиночных и половозрелых фаз развития нематод желудочно-кишечного тракта и легких.

Механизм действия препарата заключается в воздействии на нервно-мышечную систему, блокировании фумаратредуктазы и угнетении образования АТФ у паразита, что приводит к его параличу и гибели.

Препарат относится к умеренно токсичным веществам для теплокровных животных (III класс опасности), в терапевтической дозе не имеет местно-раздражающего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и сенсибилизирующего действия.

Применение

Дегельминтизация крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, собак при поражении желудочно-кишечными и легочными нематодами:

крупному рогатому скоту - *Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Trichuris spp., Dictyocaulus viviparus;*

овцы, козы - *Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Strongyloides spp., Trichuris, Dictyocaulus filaria, Chabertia ovina, Protostrongylus spp.;*

свиньи - *Ascaris suum, Hyostrongylus spp., Metastrongylus spp., Oesophagostomum spp., Trichuris suis;*

собаки - *Toxocara canis, Toxoascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala.*

Дозировка

Рекомендуемая доза Левамизол-7,5% составляет 1,0 мл препарата/10 кг массы тела животного (по действующему веществу - 7,5 мг/кг массы тела животного).

Препарат вводят без предварительной голодной диеты и слабительных средств однократно, подкожно (крупному рогатому скоту, овцам и козам можно внутримышечно).

Максимальная доза вводимого препарата одному животному, не должна превышать:

крупному рогатому скоту - 30 мл; **свиньям** - 20 мл; **овцам и козам** - 4,5 мл.

Максимальная доза препарата для введения в одно место не должна превышать: **крупному рогатому скоту** - 20 мл, **свиньям** - 10 мл, **овцам и козам** - 5 мл, **собакам** - 2,5 мл.

Противопоказания

Не обрабатывать ослабленных и больных животных!

Не использовать препарат лошадям!

Не использовать препарат собакам до годовалого возраста, собакам крупных пород до 18-месячного возраста!

Предостережение

Убой животных на мясо разрешается через 7 суток, употребление молока в пищу людям - через сутки после последнего введения препарата. В случае забоя ранее установленного срока мясо используют для кормления плотоядных животных или производства мясокостной муки, молоко выпаивают непродуктивным животным в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.

Форма выпуска

Ампулы по 2 мл, стеклянные флаконы по 10, 50, 100 мл.

Хранение

В помещениях, защищенных от прямого солнечного света при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности - 2 года при соблюдении условий хранения.

Владелец регистрационного удостоверения:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua

Производитель готового продукта:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua