



МАЗЬ КОЛАФЛОКС

листок-вкладыш

Описание

Мазь белого цвета без запаха.

Состав

100 г препарата содержит действующие вещества:

метилурацил – 3 г;

энрофлоксацин - 1 г.

Вспомогательные вещества: ПЭГ-1500, ПЭГ-400, глицерин, коллагеназа.

Фармакологические свойства

АТСvet QD06 - антибиотики и химиотерапевтические препараты для местного применения.

Мазь Колафлоркс - эффективный антибактериальный препарат, благодаря комбинированному составу препарата.

Энрофлоксацин относится к группе фторхинолонов. Он эффективен против грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (*E. coli*, *Salmonella typhimurium*, *Haemophilus paragallinarum*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Klebsiella spp.* и другие), а также против микоплазм (*Mycoplasma spp.*). Механизм действия энрофлоксацина заключается в подавлении активности фермента гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки.

Метилурацил (2,4-диоксо-6-метил-1,2,3,4-тетрагидро-пиримидин) регулирует метаболические процессы, ускоряет процессы регенерации, способствует заживлению ран, повышает уровень местного иммунитета, обладает противовоспалительным эффектом. Оказывает фотозащитное действие при фотодерматозах.

Метилурацил плохо проникает через неповрежденные ткани, накапливается в поверхностных слоях кожи и слизистых оболочек, на которые нанесена мазь. Практически не оказывает резорбтивного действия.

Мазь способствует ферментативному очищению ран, предупреждает развитие инфекции, ускоряет регенерацию (восстановление).

Применение

Мазь применяют в первую фазу раневого процесса для лечения лошадей, собак, кошек, декоративных кроликов и шиншилл при инфицированных ранах, ожогах, местных гнойно-воспалительных процессах, трещинах кожи, обморожениях, гнойно-некротических язвах, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину.

Дозировка

Препарат наносят тонким слоем на поврежденную поверхность кожи или на марлевую салфетку, а также используют для перевязки (при необходимости предварительно проводят

первичную хирургическую обработку раны) 1-2 раза в сутки. перевязки осуществляют ежедневно до полного очищения ран от гнойно-некротических масс до появления грануляций.

Продолжительность лечения зависит от тяжести и течения заболевания. Рекомендуемый курс лечения - 14 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к составным препаратам.

Предостережение

Если препарат применяют кошкам, следует следить за животным и не допускать слизывания мази.

Форма выпуска

Тубы ламинатные по 30 и 50 г.

Хранение

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 0°C до 10°C.

Срок годности препарата - 2 года.

Владелец регистрационного удостоверения:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромстач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua

Производитель готового продукта:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромстач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua