



Регистрационное свидетельство
№ АВ -02566-01-12

МАЗЬ ПАПИЛОН

листок-вкладыш

Описание

Однородная мазеобразная масса от кремового до светло-розового цвета.

Состав

100 г препарата содержит действующие вещества (г):

кислоту салициловую - 20,0;

резорцин - 5,0.

Вспомогательные вещества: ПЭГ-1500, ПЭГ-400, пропиленгликоль, глицерин.

Фармакологические свойства

АТС-vet классификационный код: QD11AF Ветеринарные препараты для устранения бородавок и ороговений.

Комбинированный противопапилломный препарат на основе кератолитических средств: кислоты салициловой и резорцина.

Двойное действие салициловой кислоты и резорцина способствует отторжению ороговевших клеток, мацерации рогового слоя эпидермиса, усилению регенерации поврежденных тканей кожи, задержке роста многих микроорганизмов и грибков, способствует уничтожению мицелия последних. Резорцин высушивает роговой слой и имеет местноанестезирующее и противозудное действия.

Применение

Препарат применяют наружно, самостоятельно или комплексно для лечения коров при папилломах (бородавках) вымени; кошек, собак - при дерматозе, дискератозе, ихтиозе, трихофитии, очаговой микроспории.

Дозировка

Перед нанесением мази кожу вокруг папилломы смазывают ланолином или вазелином. На папилломы (бородавки) наносят мазь Папилон дважды в сутки утром и вечером (после утренних и вечерних доений) в течение 1-2 недель. Возможно использование лейкопластырной или клеевой повязки.

Перед доением мазь смывают теплой водой.

При необходимости курс лечения повторяют.

При дерматозе, дискератозе, ихтиозе мазь Папилон наносят тонким слоем 2-3 раза в сутки по 2-5 г на поверхность кожи площадью 5x5 см. Лечение продолжают до стойкого исчезновения проявлений заболевания.

При трихофитии и микроспории мазь Папилон втирают в пораженные участки, захватывая здоровую кожу на 1 см вокруг, два раза в сутки в течение 2-3 недель до появления шерсти и отрицательного лабораторного анализа с пораженного участка.

Противопоказания

Не применять при повышенной чувствительности к препарату.

Не применять одновременно с сильными окислителями (бертолетовая соль, перманганат калия и др.).

Предостережение

Применять только на пораженных участках тела. Не допускать слизывания препарата животным. Избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки.

Побочное действие

Возможно возникновение зуда и ощущение жжения в месте нанесения.

Форма выпуска

Тубы ламинатные 30 г.

Хранение

В защищенном от света, недоступном для детей, месте при температуре от 5 до 25°C.

Срок годности - 2 года.

Владелец регистрационного удостоверения:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua

Производитель готового продукта:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua