

Бровітаксид
(порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Порошок білого або ледь-кремового кольору зі специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини (мг):

ампроліуму гідрохлорид – 125,0;

вітамін К₃ – 2,0;

вітамін А – 10 000 МО.

Допоміжні речовини: цукрова пудра, лактоза, або мальтодекстрин.

Фармакологічні властивості

АТСvet код QP51 антипротозойні ветеринарні препарати (QP51AX59, ампроліум, комбінації)

Ампроліуму гідрохлорид пригнічує розвиток кокцидій на стадії шизогонії першої та другої генерації, не пригнічує імунітет, але є антагоністом вітаміну В₁.

Вітамін К₃ та вітамін А підвищують функціональну здатність епітелію та зменшують крововиливи на слизовій оболонці кишечника.

Застосування

Лікування та профілактика великої рогатої худоби (телят), овець, кіз, свиней, кролів, м'ясоїдних, птиці (курей, індиків, гусей, фазанів, голубів) при ураженні еймеріями:

телята - *Eimeria bovis*, *E. cylindrical*, *E. ellipsoidea*, *E. zuernii*, а також *Cryptosporidium muris* і *C. parvus*;

вівці, кози - *Eimeria arloigni*, *E. faurei*, *E. intracata*, *E. ninaekohljakimovae*;

свині - *Eimeria deblickei*, *E. scabra*, *E. spinosa*, *E. suis*, *Isospora suis*;

кролі - *Eimeria magna*, *E. perforans*, *E. stiedae*;

м'ясоїдні - *Isospora canis*, *I. ohioensis*, *I. rivolta*, *I. felis*;

кури - *Eimeria acervulina*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella*;

індики - *Eimeria adenoeides*, *E. meleagrimitis*;

фазани - *Eimeria colchii*;

гуся - *Eimeria anseria*, *E. nocens*, *E. truncate*;

голуби - *Eimeria labbeana*.

Дозування

Препарат задають тваринам і птиці з кормом або з водою, готують суміш у кількості не більше добової потреби. Згодовують або випоюють суміш рівномірно протягом доби.

Телята:

профілактично: 0,4-0,5 г препарату на 10 кг маси тіла протягом 3-х тижнів;

лікування: 1 г препарату на 10 кг маси тіла (еймеріоз), або 1,5 г препарату на 10 кг маси тіла (криптоспоридіоз) протягом 5-10 діб.

Вівці, кози:

профілактично: 0,6 г препарату на 10 кг маси тіла протягом 3-х тижнів;
лікування: 4 г препарату на 10 кг маси тіла протягом 5 діб.

Свині:

профілактично: 0,4 г препарату на 10 кг маси тіла протягом 4-8 тижнів;
лікування: 2-4 г препарату на 10 кг маси тіла протягом 5 діб.

Кролі:

профілактично: 1 г препарату на 1 л води протягом 3-х тижнів;
лікування: 2-2,5 г препарату на 1 л води протягом 4-5 діб.

М'ясоїдні:

профілактично: сукам за 10 діб до родів воду для пиття щоденно замінюють на 0,075 % розчин (за ДР), що становить 6 г препарату на 1 л води;
лікування: 2 г препарату на 10 кг маси тіла протягом 7-10 діб.

Птиця (кури, індики, гуси, фазани, голуби):

профілактично: курчата до 2-х міс. віку, щоденно - 0,9-1 г препарату на 1 кг корму; до 4-х міс. віку - 0,7 г препарату на 1 кг корму; до початку яйцenessності - 0,4 г препарату на 1 кг корму; курчата м'ясних порід, індичата - 1 г препарату на 1 кг корму на весь період вирощування, а гусенят, голубам та фазанам - на період загрози інвазії;

лікування: незалежно від виду та віку птиці - 2 г препарату на 1 кг корму або 1 л води протягом 5-10 діб.

Протипоказання

Не застосовувати курям-несучкам!

Не застосовувати ремонтному молодняку курей старше 4-х місячного віку.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 14 діб, а птиці - 7 діб після останнього введення лікувальної дози препарату, або через 2 доби - профілактичної.

Форма випуску

Пластикові контейнери або пакети з ламінованого паперу по 10, 30, 50, 100 г та поліетиленові пакети по 500 г та 1 кг.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 4°C до 20°C.

Термін придатності

1 рік.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

бульвар Незалежності 18а, м. Бровари, Київської обл., 07400

Виробник готового продукту:

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

бульвар Незалежності 18а, м. Бровари, Київської обл., 07400