

**Брованол® плюс**  
**(таблетки)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Таблетки плоскі циліндричні зі скошеними краями, з насічкою для поділу на одній стороні та логотипом виробника на іншій, білого або сірувато-білого кольору зі слабким характерним запахом.

**Склад**

1 таблетка містить діючі речовини:

празіквантел - 50 мг;

івермектин - 2 мг;

левамізолу гідрохлорид (в перерахунку на діючу речовину) - 38 мг.

Допоміжні речовини: лактоза, глюкоза, крейда, кальцій стеариновокислий, тальк.

**Фармакологічні властивості**

*ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (ATCvet QP54A01, івермектин; QP52AE01, левамизол; QP52AA51, празіквантел)*

Препарат виявляє сукупні фармакологічні властивості трьох компонентів, що забезпечують широкий спектр протипаразитарної дії:

- празіквантел гальмує у цестод і трематод м'язову іннервацію та порушує мембранно-пропускні функції клітин, що спричиняє їх загибель;
- івермектин посилює у нематод, павукоподібних, комах та личинок оводів зв'язок ГАМК (гамма-аміномасляної кислоти) із спеціальними рецепторами на нервових закінченнях паразита, блокуючи тим самим іннервацію паразита, викликаючи його параліч і загибель;
- левамизол є ефективним імуномодулятором і при вакцинації сприяє утворенню високого рівня поствакцинального імунітету.

**Застосування**

Лікування та профілактика собак при захворюваннях, спричинених нашкірними паразитами: блохами, вошами, коростяними та іксодовими кліщами; личинками і дорослими нематодами, цестодами і деякими трематодами, а саме: анкілостомозу (збудник *Ancylostoma caninum*), дипілідіозу (*Dipylidium caninum*), дифілоботріозу (*Diphylobothrium latum*, *D. minus*), токсокарозу (*Toxocara canis*, *T. cati*), токскарідозу (*Toxascaris leonina*), трихурозу (*Trichuris vulpis* та *T. nutria*), теніозу (*Taenia hydatigena*, *T. multiceps*), унцинаріозу (*Uncinaria stenocephala*), опісторхозу (*Opisthorchis tenuicolis*, *O. viverrini*, *O. sinensis*), парагоніозу (*Paragonimus westermani*), мезоцестоїдозу (*Mesocestoides linatus*, *M. litteratus*, *M. corti*, *M. petrovi*), дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*, *D. renens*), ехінококозу (*Echinococcus granulosus* та *E. multilocularis*) (тільки статевозрілі форми) та деякими іншими паразитами.

**Дозування**

Собакам - 1 таблетка на 10 кг маси тіла. Таблетки подрібнюють і змішують з третиною кормової маси вранішнього раціону. Для молодих тварин віком до 1,5 року розраховану дозу ділять на дві частини і згодують з добовим інтервалом. При демодекозі Брованол® плюс задають повторно через 10-12 діб. Одночасно застосовують препарати для симптоматичної терапії.

Якщо у тварин відсутні нашкірні паразити, то для профілактичної дегельмінтизації слід застосовувати препарат Брованол® Д.

**Протипоказання**

Не застосовувати собакам породи колі, шелті, бобтейл та цуценятам до шестимісячного віку !

**Застереження**

Не перевищувати рекомендованих доз. Препарат застосовують тільки за рекомендацією лікаря ветеринарної медицини.

**Форма випуску**

Блістери по 10 штук, пластикові контейнери по 100 та 1000 шт.

КОНТРОЛЬОВАНИЙ

ПРИМІРНИК № 1

**Зберігання**

Сухе темне, недоступне для дітей місце при температурі до 25 °С.

**Термін придатності**

3 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині !*

**Власник реєстраційного посвідчення**

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400

**Виробник готового продукту**

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400

КОНТРОЛЬОВАНИЙ  
ПРИМІРНИК № 1