

**Трематозол™**  
**(емульсія для перорального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Однорідна емульсія світло-жовтого кольору без вираженого запаху.

**Склад**

1 мл препарату містить діючі речовини (мг):

оксиклозанід – 95,0;

пірантелу памоат – 200,0.

Допоміжні речовини: тілоза, твін-80.

**Фармакологічні властивості**

**ATCvet код QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AF02, пірантел)**

Комбінація двох діючих речовин, оксиклозаніду і пірантелу памоату, забезпечує універсально широкий спектр антигельмінтної дії відносно ключових господарсько-значимих збудників трематодозів і нематодозів, що паразитують у великої рогатої худоби, овець та кіз.

Оксиклозанід – синтетична сполука із групи саліциланіліду. Його специфічна дія обумовлює гальмування і зупинку процесу окисного фосфорилування в організмі трематод, що змінює енергетичний метаболізм паразитів та спричиняє їх загибель.

Пірантелу памоат – синтетична сполука із групи піримідинів. Його специфічна дія спричиняє у нематод деполаризовану нервово-м'язову блокаду, внаслідок паралічу м'язів, гельмінти виводяться із кишечника перистальтикою. Пірантелу памоат активний щодо личинок і статевозрілих нематод, що паразитують у травному каналі (*Neoascaris vitulorum*, *Bunostomum trigonocephalum*, *Trichostrongylus columbriformis*, *T. axei*, *Trichuris skrjabini*, *T. ovis*, *Chabertia ovina* тощо).

**Застосування**

Лікування та профілактика великої рогатої худоби, овець і кіз при гельмінтозах, спричинених видами трематод і нематод, чутливих до діючих речовин препарату.

**Дозування**

*Велика рогата худоба* - 1 мл препарату на 10 кг маси тіла одноразово з питною водою.

*Вівці та кози* - 0,75 мл препарату на 10 кг маси тіла одноразово.

Профілактично-лікувальна дегельмінтизація проводиться на початку стійлового періоду.

**Протипоказання**

Не застосовувати виснаженим тваринам!

**Застереження**

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 14 діб після останнього застосування препарату, молоко можна вживати в їжу через 1 добу.

Точне дозування під час групової дегельмінтизації тварин.

Не застосовують препарат вівцяматкам під час парувального періоду, а також у період першого місяця після видалення баранів з отари.

Не рекомендують застосовувати великій рогатій худобі у перший місяць тільності.

**Форма випуску**

Скляні або пластикові флакони по 50, 100, 1000 мл.

**Зберігання**

Суше темне місце при температурі від 5°C до 25°C.

**Термін придатності**

3 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення**

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18 а

м. Бровари Київської обл., 07400

КОНТРОЛЬОВАНИЙ  
ПРИМІРНИК № 1

**Виробник готового продукту**  
**ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)**  
б-р Незалежності 18 а  
м. Бровари Київської обл., 07400