

Бровадазол™ порошок
(порошок для перорального застосування, мікрогранульований)
листівка-вкладка

Опис

Мікрогранульований порошок від білого до сірувато-білого кольору без запаху.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину (мг):

фенбендазол - 50,0.

Допоміжні речовини: лактоза, кальцію карбонат, глюкоза, крохмаль.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AC13, фенбендазол)

Механізм дії фенбендазолу пов'язаний з порушенням енергетичного обміну, руйнуванням мікроканалів травних клітин та появою нейротоксичного ефекту у гельмінтів. Фенбендазол також згубно діє на личинки різних стадій та порушує цілісність оболонки яєць гельмінтів. Останні, при потраплянні у навколишнє середовище, не спроможні до подальшого розвитку.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, м'ясоїдних, хутрових звірів, курей, гусей при ураженні нематодами (зрілими і незрілими формами), деякими видами цестод і трематод.

Дозування

Дози і кратність застосування препарату для дегельмінтизації різних видів тварин:

Вид тварини і назва гельмінтозу	Разова доза (мг/кг маси тіла)		
	Бровадазол™ порошок	ДР	Кратність
Велика рогата худоба:			
диктіокаульоз, стронгілятоз, стронгілоїдоз	200	10	одноразово
дикроцеліоз	660	33	одноразово
цистицеркоз	500	25	3 доби поспіль
Дрібна рогата худоба:			
змішана нематодозна інвазія	300	15	одноразово
диктіокаульоз	200	10	одноразово
монієзіоз	200	10	одноразово
трихуроз	300	15	2 доби поспіль
ехінококоз, ценуроз	800	40	3 доби поспіль
дикроцеліоз	440	22	2 доби поспіль
Свині:			
аскароз	150	7,5	2 доби поспіль
трихуроз	200	10	2 рази на добу
езофагостомоз і стронгілоїдоз	200	10	одноразово
змішана інвазія: поросята з 2-х до 8-ми тижневого віку	20	1	один раз на тиждень
маточне поголів'я	150	7,5	2 рази на добу
Коні:			
параскаридоз +стронгілятоз	300	15	одноразово
стронгілоїдоз (лошата 1-2 міс. віку)	160	8	2 доби поспіль
М'ясоїдні та хутрові звірі:			
змішана інвазія	300	16	разово

Кури: на птицю			
аскаридіоз	100	5	2 доби поспіль
аскаридіоз + гетеракідоз	200	10	одноразово
Гуси: на птицю			
змішана інвазія	800	40	одноразово

Препарат згодують індивідуально або груповим методом. При груповій дегельмінтизації загальна кількість препарату збільшується на 5 %. Суміш корму з препаратом Бровадазол™ порошок згодують на початку ранкової годівлі.

Перед масовою дегельмінтизацією кожен серію препарату попередньо випробовують на невеликій кількості тварин, за якими спостерігають протягом доби. Дегельмінтизація дозволяється за відсутності ускладнень у цих тварин.

Протипоказання

Бровадазол™ порошок не можна застосовувати тваринам одночасно з протифасціольозними препаратами, а також упродовж 7 діб після лікування тварин бромсаланами.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяють після останнього застосування препарату :

- велика рогата худоба, вівці, кози, свині – через 10 діб;
- птиця – через 3 доби.

Використання внутрішніх органів тварин (печінки, легень, серця) в їжу дозволяється через 20 діб.

Споживання молока людьми дозволяють через 2 доби після останнього застосування препарату.

Форма випуску

Пакети із полімерних матеріалів по 10, 100, 1000 г.

Зберігання

Суше темне місце при температурі до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА", Україна

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА", Україна

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400