



ukrzoovet.com.ua

Реєстраційне посвідчення  
№ АВ -01041-01-10

## ПРИСИПКА ДЛЯ РАН

листівка-вкладка

### Опис

Однорідний порошок від світло-жовтого до жовтого кольору із специфічним запахом ксероформу.

### Склад

100 г препапарату містить діючі речовини:

ксероформ - 5 г

стрептоцид - 5 г

Допоміжні речовини: тальк, крохмаль.

### Фармакологічні властивості

**ATC vet класифікаційний код QD06 – антибіотики та хімотерапевтичні препарати для місцевого застосування. QD06BA99 – Сульфаніламід, у комбінаціях.**

Ксероформ має в'яжучі, підсушуючі властивості, звужує судини, зменшує ексудацію, знижує чутливість і послаблює запальні процеси. Сильний антисептик.

Стрептоцид відноситься до сульфаніламідних сполук. Він характеризується широким спектром антимікробної дії проти грампозитивних (*Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, та інші) і грамнегативних мікроорганізмів (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.* та інші), але майже неактивний по відношенню до стафілококів. Стрептоцид діє бактеріостатично, перешкоджаючи використанню пара-амінобензойної кислоти мікроорганізмами для синтезу дигідрофолієвої кислоти, яка бере участь у синтезі піримідинових основ ДНК та РНК мікробної клітини.

### Застосування

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак та котів при захворюваннях шкіри ( екзема, дерматит, виразка), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до стрептоциду та ксероформу. Для обробки післякастраційних ран та профілактики післякастраційних ускладнень.

### Дозування

Зовнішньо. При необхідності ушкоджену ділянку шкіри очищують та припудрюють препаратом та 2-3 см навколо неї. Ушкоджені ділянки обробляють 1-2 рази на добу до загоєння.

### Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до стрептоциду та ксероформу.

### Застереження

Немає

### Форма випуску

Поліетиленові банки або поліетиленові чи ламіновані пакети по 50 та 500г.

### Зберігання

Суше, темне, недоступне для дітей місце, при температурі від 0°C до 25°C.

Термін придатності - 3 роки.

**Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту**

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»

Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,

Тел. 0800211201