

12.07.2021

**Тилмік 25%**  
**(розчин для перорального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Однорідний прозорий розчин жовтуватого кольору.

**Склад**

1 мл препарату містить активно діючу речовину:

тилмікозин – 250,0 мг.

Допоміжні речовини: динатрію едетат, пропілгалат, кислота ортофосфорна, вода високоочищена.

**Фармакологічні властивості**

АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01FA91 □ Тилмікозин.

Тилмікозин – напівсинтетичний антибіотик із групи макролідів, який у низьких концентраціях діє бактеріостатично, а у високих – бактерицидно на грампозитивні (*Clostridium perfringens*, *Actinomyces spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Arcanobacterium pyogenes*) та грамнегативні (*Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Campylobacter spp.*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mannheimia haemolytica* тощо) бактерії та *Mycoplasma spp.* Механізм дії препарату полягає в блокуванні синтезу білка в бактеріальній клітині в результаті утворення комплексу з 50S-субодинами рибосом.

За перорального введення препарату з питною водою, молоком, заміником молока або рідким кормом у рекомендованій дозі, тилмікозин швидко і майже повністю всмоктується з травного каналу, переходить із плазми крові в легені. В результаті цього в сироватці крові спостерігається низький рівень тилмікозину, а в легенях і макрофагах легеневої тканини – найвищий, який фіксується вже через 6 годин. Терапевтичні концентрації препарату в усіх органах та тканинах організму підтримуються протягом 48 годин.

У курчат терапевтичний рівень тилмікозину досягається у повітряних мішках раніше, ніж за 6 годин. У індиків тилмікозин концентрується в легенях і повітряних мішках.

У телят тилмікозин визначається в легенях через 6 годин і утримується протягом 60 годин. Його високі концентрації виявляють також в печінці та нирках. У свиней максимальна концентрація тилмікозину спостерігається в легенях.

Тилмікозин виділяється з організму, головним чином, з жовчю, а незначна кількість – з сечею.

**Застосування**

Телята, віком до 3 місяців: лікування тварин при захворюваннях органів дихання, що спричинені мікроорганізмами (*Mycoplasma bovis*, *M. dispar*, *Mannheimia haemolytica*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Pasteurella multocida*, *P. haemolytica* та іншими), чутливими до тилмікозину.

Свині: лікування тварин при захворюваннях органів дихання, що спричинені мікроорганізмами (*Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Arcanobacterium pyogenes* та іншими), чутливими до тилмікозину.

Кури (бройлери, ремонтний молодняк, батьківське стадо) та індики: лікування птиці при захворюваннях органів дихання, що спричинені мікроорганізмами (*Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida* та іншими), чутливими до тилмікозину.

**Дозування**

Перорально з питною водою або заміником молока у дозах:

свині - 15-20 мг тилмікозину на 1 кг маси тіла щодобово протягом 5 діб або 80 мл Тилмік 25% на 100 л питної води;

кури (бройлери, ремонтний молодняк, батьківські пари) та індики - 75 мг тилмікозину на 1 л питної води щодобово протягом 3 діб або 30 мл Тилмік 25% на 100 л питної води, або добова доза

12.07.2021

становить 15-20 мг тилмікозину на 1 кг маси тіла курчат та 10-27 мг тилмікозину на 1 кг маси тіла індики протягом 3 діб;

телята – 1 мл препарату на 20 кг маси тіла двічі на добу протягом 3-5 діб.

Розчин препарату готують щоденно з розрахунку 30 мл препарату на 100 літрів (що відповідає 1 мл препарату на 3,3 літри) питної води.

Термін придатності розчину препарату – 24 години після розведення у питній воді.

#### **Протипоказання**

Підвищена чутливість до тилмікозину.

Не застосовувати при виявленні стійких штамів патогенних бактерій, резистентних до макролідів.

Не застосовувати жуйним тваринам з функціонально розвиненими передшлунками.

Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких використовують для споживання людиною.

Не застосовувати одночасно з антибіотиками аміноглікозидного ряду та іншими макролідами.

Не застосовувати препарат у суміші з кормом, який містить бентоніти.

Не застосовувати коням.

#### **Застереження**

##### *Побічна дія*

При застосуванні препарату відповідно до рекомендацій виробника побічних явищ і ускладнень, як правило, не відзначається. В окремих випадках можливе короточасні розлади травного каналу.

##### *Особливості застереження при використанні*

Через можливий розвиток резистентних штамів мікроорганізмів, подібно до всіх макролідів, препарат слід застосовувати лише з урахуванням результатів тестувань чутливості мікроорганізмів до тилмікозину.

##### *Застосування під час вагітності, лактації, несучості*

Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких використовують для споживання людиною.

##### *Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії.*

Не застосовувати препарат у суміші з кормом, який містить бентоніти.

##### *Період виведення (каренція)*

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяють через 12 діб (курчата), 14 діб (свині), 19 діб (індики, кури-бройлери) та 42 доби (телята) після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

#### **Форма випуску**

Ампули з полімерних матеріалів по 1,0 мл; флакони з полімерних матеріалів і контролем першого відкриття по 10, 30, 90, 300, 600 та 1000 мл.

#### **Зберігання**

Суше темне, недоступне для дітей місце за температури від 10 °С до 30 °С.

Термін придатності – 3 роки.

Після першого стерильного відкриття флакону, препарат слід використати протягом 90 діб при умові зберігання в темному сухому місці при температурі від 5 до 25 °С. Після розчинення препарату у питній воді розчин необхідно використати протягом 24 годин.

#### **Для застосування у ветеринарній медицині!**

#### **Власник реєстраційного посвідчення:**

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

#### **Виробник готового продукту:**

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна